

DB154

INCAPACIDADE FÍSICA EM PACIENTES COM DIAGNÓSTICO DE HANSENÍASE NO MUNICÍPIO DE BURITICUPU.

PATRÍCIA S PIRES¹, ARLENE JM CALDAS¹, JACKSON ML COSTA², DORLENE MC AQUINO¹.

1. Departamento de Enfermagem. Universidade Federal do Maranhão. 2. Centro de Pesquisas Gonçalo/FIOCRUZ-BA

Introdução: A hanseníase é uma infecção crônica cujo diagnóstico precoce é fundamental para a prevenção das incapacidades físicas decorrentes da hanseníase. A avaliação neurológica, classificação do grau de incapacidades e a aplicação de técnicas básicas de prevenção, controle e tratamento são tarefas fundamentais a serem realizadas no combate à principal causa do estigma social da hanseníase. **Objetivo:** Estudar as alterações e incapacidades físicas em portadores de hanseníase atendidos nos programas de Controle da Hanseníase no município de Buriticupu – MA. **Material e Métodos:** Realizou-se um estudo transversal, no período de setembro de 2006 a agosto de 2007, em portadores de hanseníase residentes em Buriticupu – MA. A população estudada foi constituída de todos os pacientes residentes em Buriticupu com diagnóstico de hanseníase no período de janeiro de 2005 a dezembro de 2006, e em registro ativo. Utilizou-se como instrumento de pesquisa a ficha de Avaliação Simplificada das Funções Neurais e Complicações padronizada pelo Ministério da Saúde. **Resultados:** Foram avaliados 75 pacientes portadores de hanseníase residentes no município de Buriticupu - MA. Observou-se que 52 (69,3%) indivíduos apresentaram algum grau de incapacidade física, sendo predominante o grau I (56%). Os percentuais de incapacidades físicas foram de 94,2% nos pés, 92,3% nas mãos e 76,9% nos olhos, com predomínio do sexo masculino (65,3%); faixa etária de 20 a 39 anos (38,4%); ocupação lavrador (44,25). **Conclusão:** Concluiu-se que devido a hiperendemicidade da área, a população necessita de um maior esclarecimento sobre a doença e aos pacientes orientações de como prevenir incapacidades.