

ESTUDO DAS INTERNAÇÕES DE IDOSOS POR CONDIÇÕES SENSÍVEIS À ATENÇÃO PRIMÁRIA (ICSAP): UMA COMPARAÇÃO ENTRE RIO DE JANEIRO E MINAS GERAIS

Dalia Elena Romero (Dalia Elena Romero) (/proceedings/100058/authors/340717)¹; Aline Pinto Marques (Aline Pinto Marques) (/proceedings/100058/authors/343207)²; Jéssica Muzy Rodrigues (Jéssica Muzy Rodrigues) (/proceedings/100058/authors/340719)²; Diego Cavalcanti de Santana (Diego Cavalcanti de Santana) (/proceedings/100058/authors/343208)³; Leo Ramos Maia (Leo Ramos Maia) (/proceedings/100058/authors/343209)⁴

#101380

s/estudo-das-internacoes-de-idosos-por-condicoes-sensiveis-a-atencao-primaria--icsap---uma-comparacao-entre-rio-de-janeiro)

Apresentação/Introdução

O indicador de ICSAP, representa um conjunto de problemas de saúde para os quais a efetiva ação da atenção primária diminuiria o risco de internações. Esse indicador, ainda tem sido pouco utilizado para a população idosa. A geriatria e gerontologia não costumam dar relevância à Atenção Primária e muitas vezes não consideram os dispositivos do SUS na atenção aos idosos.

Objetivos

Apoiar o estudo da avaliação da atenção primária para Idosos considerando um indicador de eficácia chamado Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária.

Metodologia

As fontes de informação foram: o SIH/SUS, o SIAB e as estimativas populacionais do IBGE. A população de estudo foi: idosos de 60 a 74 anos, residente no RJ ou MG entre 2000 e 2012. Calculou-se taxas de internações por ICSAP e coberturas da ESF. A ICSAP foi definida a partir da lista de diagnósticos estabelecida pelo MS na Portaria nº.221/2008. A Variação Relativa Percentual das taxas de ICSAP foi usada para quantificar as mudanças ocorridas no tempo. Foram feitos testes de correlação entre a taxa de ICSAP e a cobertura da Estratégia de Saúde da Família como uma medida de acesso aos serviços de atenção primária através do Coeficiente de Correlação de Pearson.

Resultados

Foi observada alta correlação entre o aumento da cobertura dos idosos na ESF e as taxas de internação por condições sensíveis à Atenção Primária (coeficiente de correlação de Pearson de -0,79). A redução da taxa por ICSAP foi acentuada, de 600 a 300 por 100.000 idosos entre 2000 e 2014. Além da redução da Taxa de mortalidade ICSAP observa-se também redução de suas desigualdades regionais. As regiões Sul e Centro-Oeste apresentaram redução mais acentuada até 2008 e a partir desse ano verifica-se a tendência consistente de redução da mortalidade em todas as regiões.

Conclusões/Considerações

O indicador de ICSAP aplicado à população idosa não apenas permite reconhecer o impacto do programa de Atenção Básica mas também da informação sobre o sucesso na procura de vida com mais qualidade. Por isso, os autores deste trabalho sugerem utilizar tal indicador como medida de busca da compressão da morbidade de idosos. A redução de danos das doenças, sejam transmissíveis ou não, é fundamental para o envelhecimento saudável.

Tipo de Apresentação

Oral

Instituições

¹ ICICT/FIOCRUZ ;

² ENSP/FIOCRUZ e ICICT/FIOCRUZ ;

³ ICICT/FIOCRUZ e UERJ ;

⁴ ICICT/FIOCRUZ e UFRJ

Eixo Temático

Organização da Atenção da Saúde: Modelos, Redes e Regionalização da Saúde

Como citar este trabalho?