

## DETERMINANTES SOCIAIS DA SÍNDROME CONGÊNITA DO ZIKA VÍRUS: UMA ANÁLISE DO PERFIL DAS FAMÍLIAS ATENDIDAS EM UM INSTITUTO DE ALTA COMPLEXIDADE.

Maíra Carvalho da Silva (Maíra Carvalho da Silva) (/proceedings/100058/authors/341891)<sup>1</sup>; Alessandra Gomes Mendes (Alessandra Gomes Mendes) (/proceedings/100058/authors/341867)<sup>2</sup>; Ana Lúcia Tiziano Sequeira (Ana Lúcia Tiziano Sequeira) (/proceedings/100058/authors/341892)<sup>1</sup>

ers/determinantes-sociais-da-sindrome-congenita-do-zika-virus--uma-analise-do-perfil-das-familias-atendidas-em-um-instituto-)

### Apresentação/Introdução

As crianças acometidas pelo Zika Vírus durante a gestação apresentam diversas condições de saúde crônicas complexas, neste sentido compreende-se a importância de identificar o perfil das famílias para ampliação do conhecimento sobre os determinantes sociais em saúde que favoreceram a exposição ao vírus e dar visibilidade às demandas sociais para estas crianças e suas famílias.

### Objetivos

Conhecer os Determinantes Sociais de Saúde da Síndrome Congênita do Zika Vírus a partir do perfil de famílias atendidas no Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira/FIOCRUZ.

### Metodologia

Foi realizado um estudo descritivo-exploratório, com vistas a conhecer o perfil de famílias, cujas crianças já haviam recebido o diagnóstico da Síndrome Congênita do Zika Vírus. Para tanto, utilizou-se como fonte secundária, 50 fichas de entrevistas sociais realizadas durante o período de outubro de 2016 a agosto de 2017 pela equipe do projeto "Os Caminhos do enfrentamento às implicações sociais da Síndrome Congênita do Zika vírus". A coleta de dados foi realizada de 01/08/2017 a 31/09/2017.

### Resultados

O perfil das crianças correspondeu a 26 meninas e 24 meninos com idades entre 7 meses a 1 ano e 6 meses, acompanhadas por responsáveis do sexo feminino (49). Residem na região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro 41 famílias. A escolaridade das mães é superior ao dos pais, porém possuíam menor inserção no mercado de trabalho. Foi observado que os benefícios assistenciais contribuem na melhora da renda familiar. As famílias utilizam-se mais de 1 condução para chegar até os locais de tratamento. A reabilitação é realizada em mais de uma instituição, conforme necessidade da criança. 30 famílias recebiam medicação pelo SUS, mas quando não disponível, precisam custear por conta própria.

### Conclusões/Considerações

Conclui-se que os Determinantes Sociais em Saúde podem influenciar no cuidado em saúde de crianças acometidas pelo Zika Vírus. Estas apresentam condições crônicas complexas e necessitam de acesso a consultas, exames e medicamentos que pode trazer rebatimentos na renda das famílias estudadas. As dificuldades na oferta de recursos de saúde no SUS trazem desdobramentos importantes para o cuidado de crianças com a Síndrome Congênita do Zika Vírus.

### **Tipo de Apresentação**

Comunicação Oral Curta

### **Instituições**

<sup>1</sup> Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira/FIOCRUZ;

<sup>2</sup> FIOCRUZ

## **Eixo Temático**

Determinação Social, Desigualdades e Promoção da Saúde

## **Como citar este trabalho?**